

Ptaki drapieżne


ad. – osobnik dorosły

juv. – osobnik w upierzeniu
młodocianym

Ptaki szponiaste w Polsce



Sylwetki w locie



Błotniak łąkowy

Circus pygargus
Montagu's harrier

wąskoskrzydłe
4 palce

ad. ♀



ad. ♂



juv.



Lęgowsy w Polsce
Breeding in Poland

szerokoskrzydłe
5 palców

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus
Hen harrier

ad. ♀



ad. ♂



juv.




Błotniak stawowy

Circus aeruginosus
Marsh harrier



ad. ♀



ad. ♂

szerokoskrzydłe
5 palców



juv.

Lęgowy w Polsce
Breeding in Poland

Samce błotniaków



Błotniak zbożowy



Błotniak stawowy



Błotniak łąkowy



Błotniak stepowy

Samice błotniaków



Błotniak zbożowy



Błotniak stawowy



Błotniak łąkowy



Błotniak stepowy

Błotniak stawowy

- Grzbiet brunatny
- Środkowe sterówki niepręgowane
- Samiec ma na górnej stronie popielaty ogon i część skrzydeł
- Samica ma jasną prawie białą głowę, młody ptak żółtą
- Pokrywy nadogonowe są białe
- Sterówki środkowe niepręgowane
- Wycięcia na zewnętrznych chorągiewkach 2-5 lotki

Błotniak zbożowy

- Samiec z wierzchu popielatoszary z białymi pokrywami nadogonowymi
- Spód ciała biały
- Samica i młode ptaki są brunatne z białymi pokrywami nadogonowymi
- Sterówki środkowe poprzecznie pręgowane
- Wycięcia na zewnętrznych chorągiewkach 2-5 lotki

Błotniak łąkowy (popielaty)

- Samiec z wierzchu popielaty
- Samica i młode jak u zbożowego
- Na lotkach drugiego rzędu dwie poprzeczne pręgi
- Pokrywy nadogonowe szare
- Na białym brzuchu rdzawe plamy
- Wycięcia na chorągiewkach 2-4. lotki
- Wycięcie chorągiewki 1. sięga ok. 2-4 cm poza zakończenie pokryw skrzydłowych

Błotniak stepowy (biały)

- Samiec z wierzchu jasno-szaro-niebieskawy
- Samica jak u zbożowego
- Pokrywy nadogonowe nie są białe
- Spód cały biały
- Wycięcia na chorągiewkach zewnętrznych 2-4 lotki
- Wycięcie chorągiewki 1. sięga o 1cm poza zakończenie pokryw skrzydłowych

Kania czarna



Kania ruda



Kania czarna

- Skok opierzony do nasady palców
- Ogon nieznacznie rozwidlony
- Środkowe sterówki poprzecznie pręgowane
- Spód skrzydeł jednolicie ciemny

Kania ruda

- Skok opierzony do nasady palców
- Ogon wyraźnie rozwidlony
- Sterówki bez poprzecznych pręg
- Pomędzy końcem a zgięciem skrzydła wyraźna plama

Orlik grubodzioby i krzykliwy



Orlik krzykliwy

- Skoki opierzone aż do nasady palców
- Nozdrza okrągłe
- Ptak ziemisto-brunatny z „orlimi” skrzydłami
- z dłuższym równomiernie szarobrązowym ogonem

Orlik grubodzioby

- Skoki opierzone aż do nasady palców
- Nozdrza okrągłe
- Upierzenie ciemno-brunatne, prawie czarne
- Końce piór nadogonowych białe

Orzełek i myszołów



Krogulec i jastrząb



Krogulec

- Ptak w przybliżeniu wielkości gołębia
- Długi ogon i dość szerokie skrzydła
- Na boku szczęki brak zęba

Jastrząb

- Ptak średniej wielkości – przybliżonej do myszołowa
- Brak wyraźnego zęba
- Skrzydło najwyżej o 15 cm dłuższe niż długość ogona
- Ptak stary szary, od spodu poprzecznie prążkowany
- Młody brunatny, od spodu z podłużnymi plamkami

Literatura

- „Klucze do oznaczania kręgowców i niektórych oznak ich bytowania” aut. G. Jamrozy